




國際畜政聯盟乳牛蹄部健康圖



第二版 2020年1月

THE GLOBAL STANDARD
FOR LIVESTOCK DATA

Asymmetric claws (AC)不對稱蹄趾  © Fredler, GER 外趾與內趾寬度、深度及長度上明顯不一致，即便是修蹄後也無法取得平衡。	Concave dorsal wall (CD)蕪蹄  © Thomas, FRA 趾背凹形，蹄尖壁的角質增厚。	Corkscrew claw (CC) 翻卷蹄（螺旋蹄）  © Kofler, AUT 不管是外趾還是內趾均扭曲，趾背邊緣不是一直線。	Digital dermatitis (DD) 疣狀皮膚炎  © Müller, GER 由於趾間皮膚感染，造成疼痛性潰瘍或者是角質化與增生。
Interdigital/superficial dermatitis (ID)趾間皮膚炎  © Knappe-Poindecker, NOR 趾間濕疹且發生皮膚炎症，但不是蹄葉炎。	Double sole (DS)雙重蹄底  © Fjelldaa, NOR 蹄底雙層或多層	Heel horn erosion (HHE)蹄跟踵糜爛  © Müller, GER 蹄底和蹄球踵而糜爛，多形成V字型，很有可能糜爛已擴到真皮層。	Interdigital hyperplasia (IH)趾間皮膚增生  © Kofler, AUT 趾間生長纖維性組織
Axial horn fissure (HFA)蹄趾間裂  © Malmo, AUS 內趾壁縱向裂縫	Horizontal horn fissure (HFH)蹄趾壁橫裂  © Greenough, CAN 蹄趾壁橫裂	Vertical horn fissure (HFV)蹄趾壁縱裂  © Kofler, AUT 外趾壁縱向裂開	Interdigital phlegmon (IP)趾間蜂窩組織炎  © Kofler, AUT 突發性蹄病，帶有難聞氣味、對稱疼痛與跛行。
Sole hemorrhage diffused (SHD)蹄底瀰漫性出血  © Capion, DK 出現瀰漫性淡紅色至淡黃色	Sole hemorrhage circumscribed (SHC)蹄底局部出血  © Kofler, AUT 褪色的皮膚和正常皮膚明顯看出差別	Thin sole (TS) 蹄底變薄  © Fiedler, GER 蹄底變薄，用手指按壓時感覺如海绵状。	White line fissure (WLF)白線蹄裂  © Kofler, AUT 兩趾分離，白線變寬
Sole ulcer (SU) 蹄底潰瘍  © Delacroix, FRA 底潰瘍滲透漏出新鮮真皮層或者壞疽性真皮	Bulb ulcer (BU) 蹄球潰瘍  © Kofler, AUT 潰瘍位於蹄球	Toe ulcer (TU) 蹄尖潰瘍  © Fjelldaa, NOR 潰瘍位於蹄尖	Toe necrosis (TN) 蹄尖壞死  © Delacroix, FRA 蹄尖壞死並蔓延至骨組織

繁體中文翻譯：
吳明哲、朱巧倩。2020。
行政院農業委員會畜產試驗所
台灣台南市新化區牧場路112號